

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN <sup>28</sup>  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - CÔTE D'OR - SAÔNE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 187 - 30 Avril 1980

## V I G N E

ARAIGNEES ROUGES : On observe actuellement les toutes premières éclosions des oeufs d'hiver, il est par conséquent beaucoup trop tôt pour traiter.

## H O U B L O N

MILDIOU : L'élongation des lianes, un moment freinée par le froid, repart, et les mises à fil commencent. Brûler les pousses spiciformes déjà présentes afin d'éviter des contaminations secondaires et effectuer le premier traitement anti-mildiou. On peut utiliser les produits suivants :

- produits cupriques : 250 à 500 g. de cuivre/hectolitre
- produits organo-cupriques : dose du fabricant
- captafol : 180 g./hl Difosan, Orthodifolatan
- mancozèbe : 180 g./hl Dithane M 45, Sandozèbe
- propinèbe : 220 g./hl Antracol

Les nouveaux fongicides systémiques commercialisés sur vigne peuvent également être employés selon indications du fabricant :

- métalaxyl + cuivre (Acylon bleu), métalaxyl + folpel (Acylon F)
- phosétyl d'Al. (Aliette)
- phosétyl + folpel (Mikal), phosétyl + mancozèbe
- milfurame + folpel (Vamin, Caltan)

ainsi que les fongicides à base de curzate.

## C É R É A L E S

ROUILLE JAUNE : Les tous premiers foyers ont été signalés le 15 avril dans le Nord du département de l'YONNE (SENONAIS) et les observations du début de la semaine nous montrent une progression des symptômes. Etant donné la forme "explosive" de la maladie, à partir de foyers isolés, nous conseillons aux agriculteurs de surveiller attentivement leurs cultures et plus particulièrement les variétés suivantes : Lutin, Joss, Talent, Castan,...

Les manifestations de cette rouille sont très caractéristiques : les limbes des feuilles portent, surtout sur la face supérieure, des pustules jaunes orangées, alignées entre les nervures, laissant une poudre jaunâtre au toucher.

Compte tenu de l'élévation actuelle des températures favorable à l'extension de la maladie, le traitement doit intervenir aussitôt la détection des premiers foyers. Nous préconisons l'utilisation de produits à base d'oxycarboxine, de triadiméfon, de tridémorphe ou de triforine.

PUCERONS : Quelques colonies de *SITOBION AVENAE* sont observées. Aucune intervention n'est à préconiser actuellement.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P 130